



# Urgences chez les petits animaux: quoi faire?

Présentée par Cendrine Gosselin, TSA  
Par Lisa-Marie Nadeau, TSA



# Ordre du jour :

- Les urgences « Classiques »
- Les urgences mineures
- Les urgences majeures



# Les classiques

- Mon animal a de la diarrhée
- Mon animal a des vomissements
- Mon animal a des vomissements ET de la diarrhée
- Mon animal ne mange pas
- Mon animal boite
- Mon animal a les yeux rouges
- Mon animal semble avoir une otite
- Mon animal salive beaucoup
- Mon animal se gratte



# Mon animal a de la diarrhée



Mon animal a  
de la diarrhée

Première étape:



Reste calme!

# Mon animal a de la diarrhée

- Est-ce que mon animal aurait pu manger quelque chose d'inhabituel ? (plante, gazon, neige...)
- Nourriture facilement digestible (i/d de Hill's®, EN de Purina® ...), ou diète maison (riz blanc + steak haché) exclusivement pour au moins 48hrs
- Le kaopectate (1 ml/kg TID) et le Peptobismol® (1 ml/5 kg TID) peuvent être donnés au chien, mais à éviter chez le chat
- Il n'est pas recommandé de donner de l'Imodium® chez le chat et le chien
- Probiotiques (Fortiflora®, Acute care®, ...)
- Analyse de selle



## Mon animal a de la diarrhée

Il est recommandé de consulter si:

- aucune amélioration après 48hrs de soins
- présence de sang ou de mucus
- l'état général de l'animal se détériore
- s'il s'agit d'un chiot de moins de 4 mois (Parvovirus, parasitisme).



# Mon animal a des vomisse- ments



Mon animal a  
des  
vomissements

Première étape:



Rester calme!

# Mon animal a des vomissements

- Est-ce que mon animal aurait pu manger quelque chose d'inhabituel ? (plante, gazon, neige...)
- Jeûne complet 8 à 12h.
- S'il n'a pas vomit durant la période de jeûne, donner des petites quantités d'eau à la fois
- Graval® rarement efficace chez les animaux, peut causer hypotension
- S'il garde bien l'eau, donner des petites quantités de nourriture facilement digestible. Le lendemain: retour aux portions normales.



# Mon animal a des vomissements

Il est recommandé de consulter si:

- aucune amélioration après 48h de soins
- présence de sang
- l'état général de l'animal se détériore
- s'il s'agit d'un chiot de moins de 4 mois (Parvovirus, parasitisme)
- si vous croyez que votre animal aurait pu s'intoxiquer ou manger un corps étranger.

★ ATTENTION au jeûne prolongé chez chiens de très petites races ou chiots/ chaton : risque d'hypoglycémie. Appliquer du Nutrical® ou sirop de maïs sur les gencives aux 2 heures.



wiseGEEK

Mon animal  
a des  
vomisse-  
ments ET de  
la diarrhée



Mon animal a  
des  
vomissements  
ET de la  
diarrhée

Première étape:




Rester calme!


# Mon animal a des vomissements ET de la diarrhée

## Quoi faire ?

- Jeûne complet 8 à 12h.
- S'il n'a pas vomit durant la période de jeûne, donner des petites quantités d'eau à la fois.
- S'il garde bien l'eau, donner des petites quantités de nourriture facilement digestible pour au moins 48hrs
- Probiotiques (Fortiflora®, Acute care®, Progut®, ...)
- Analyse de selle
- Il est recommandé de consulter si:
  - aucune amélioration après 48hrs de soins
  - présence de sang
  - l'état général de l'animal se détériore
  - s'il s'agit d'un chiot de moins de 4 mois (Parvovirus, parasitisme)
  - si vous croyez que votre animal aurait pu s'intoxiquer ou manger un corps étranger



Mon animal  
ne mange  
pas



Mon animal ne  
mange pas

Première étape:



Reste calme!


# Mon animal ne mange pas

- Est-il intéressé par autre chose (nourriture de table, gâteries...)?
- Lui offrir un « buffet » : 2-3 types de croquettes, de la nourriture humide, des gâteries, des petits morceaux de nourriture de table (poulet, steak haché, poisson...), réchauffer la nourriture et trouver ce qu'il préfère.
- Le stimuler à manger: en le flattant, présenter de la nourriture dans nos mains, ...
- S'il se laisse bien manipuler, lui ouvrir la gueule et vérifier s'il n'y a pas quelque chose d'anormal (rougeur, plaie, dent cassée ...)
- Si la perte d'appétit perdure plus de 24-48h, consulter un vétérinaire.

★ Attention chat obèse: risque de lipidose hépatique



# Mon animal boite



Mon animal  
boite

Première étape:



Rester calme!

## Mon animal boite

- L'avez-vous vu faire un faux mouvement, tomber, se blesser à la patte? Une griffe est peut-être cassée?
- Si c'est le cas et que la blessure est récente, appliquer du chaud/froid en alternance.
- Met-il du poids dessus?
- Repos LE PLUS COMPLET POSSIBLE pendant 24-48h.
- ★ Ne jamais donner de *Tylenol*®, *Advil*®, *Motrin*®, *Aspirine*®, ces produits peuvent être très néfastes pour nos animaux.
- Consulter un vétérinaire si:
  - aucune amélioration après 24hrs de repos
  - votre animal vocalise, manifeste une douleur aiguë
  - s'il y a présence de sang ou plaie



Mon  
animal  
salive  
beaucoup



Mon animal  
salive  
beaucoup


Première étape:



Rester calme!  
Il n'a  
probablement  
pas la rage.

# Mon animal salive beaucoup

- L'hypersalivation peut être un signe de nausées, de blessure à la gueule, de douleur à une dent, de rage.
- Vient-il juste de manger quelque chose qui a mauvais goût? Comme une plante, médication?
- Essayer sa gueule puis lui présenter de l'eau
- Cerenia®
- Son vaccin contre la rage est-il à jour? Cas de rage au Québec
- Consulter un vétérinaire si:
  - l'hypersalivation persiste plus d'une heure
  - vous notez une plaie, une dent fracturée...
  - votre animal refuse également de manger



# Mon animal salive beaucoup

## Causes du ptyalisme (salivation excessive)

- Nausées
- Ulcères buccaux (calicivirus)
- Papillomes oraux
- Dent fracturée
- Maladie parodontale (gingivite, abcès...)
- Corps étranger buccal (brindille entre les dents...)
- Cancer de la gueule
- Électrocution
- Maladie métabolique qui causent des nausées et des douleurs abdominales (IRC, obstruction digestive...)
- Maladie neurologique qui empêche l'animal d'avaler.



# Mon animal a les yeux rouges



Mon animal a  
les yeux  
rouges

Première étape:




Rester calme!

## Mon animal a les yeux rouges

- Pour tout problème oculaire, il est fortement recommandé de consulter un vétérinaire sans tarder.
- ★ Attention! Le polysporin ophtalmique humain peut causer des réactions allergiques graves chez le chat.



## Mon animal a les yeux rouges



Des yeux rouges peuvent cacher de multiples maladies.

Selon vous laquelle de ces conditions est la plus douloureuse et risque de causer la perte de vision irréversible chez le chien?



a) Conjunctivite bactérienne, va bien répondre à un onguent antibiotique.



b) **Glaucome aigu**, augmentation de la pression intraoculaire. En quelques heures le chien peut perdre la vision. Douleur importante. Devra sans doute subir une chirurgie. D'ici là, contrôle de la pression avec de multiples médicaments et analgésie.



c) Uvéite, inflammation de la chambre antérieure de l'œil. L'animal devra recevoir des antibiotiques ophtalmiques, des anti-inflammatoires et des médicaments pour contrôler la douleur et éviter les complications.

Mon  
animal  
semble  
avoir une  
otite



## Mon animal semble avoir une otite

- Symptômes: douleur et rougeur de l'oreille, présence de sécrétions brun-rouge, mauvaise odeur, démangeaisons, l'animal se secoue la tête très souvent.
- Soins à la maison: nettoyer les oreilles 1 fois par jour pour 3 jours avec un nettoyant otique asséchant et antibactérien.
- Consulter un vétérinaire si:
  - aucune amélioration malgré les soins maison
  - sang ou des plaies présentes
  - la rougeur s'intensifie après le nettoyage
  - il s'agit d'un chat (mites d'oreilles).




## Mon animal semble avoir une otite

- Le Polysporin® otique est rarement efficace pour traiter l'otite du chien.
- L'otite du chien est souvent causée par la présence de bactéries et de levures, on doit donc utiliser des gouttes contenant un antibiotique ET un antifongique.
- On doit généralement utiliser un anti-inflammatoire pour soulager le chien.



## Complication d'une otite non-traitée

Mon animal  
semble avoir  
une otite



Othématome

Mon  
animal se  
gratte  
beaucoup



Mon animal se  
gratte  
beaucoup

Première étape:



Rester calme! Il  
n'est pas  
nécessairement  
infesté de puces!

Mon animal se  
gratte  
beaucoup

## Causes les plus fréquentes de démangeaisons



- Parasites (puces, mites, demodex, sarcopte)
- Infections bactériennes cutanées
- Allergies (alimentaire, environnementale, saisonnière)
- Teigne et levures cutanées
- Comportemental



# Mon animal se gratte beaucoup

## À faire à la maison :

- Mettre un collier élisabéthain pour éviter que l'animal se blesse.
- Vérifier pour la présence de puces ou déchets de puces (test de la feuille blanche).
- S'il n'y a pas de plaie, essayer un shampoing apaisant à base d'avoine.
- Si la démangeaison touche uniquement le bout des pattes: essayer une trempette de sel d'Epsom (2 c. soupe dissout dans 2 tasses d'eau tiède). Tremper les pattes 5 min matin et soir pendant 7 à 10 jours (ou jusqu'à résolution des symptômes).



Mon animal se  
gratte  
beaucoup

Consulter un vétérinaire si:

- Présence de plaies, boutons, gales, perte de poils par plaques.
- Les démangeaisons persistent malgré les soins maison.



# Les urgences mineures

- Mon animal s'est fait mordre / griffer
- Mon animal a mangé du chocolat
- Mon animal a mangé une plante (et autres types d'intoxications)
- Mon animal fait une crise d'épilepsie
- Mon animal s'est fait piqué par un insecte et enfle
- Mon animal s'est fait arrosé par une mouffette
- J'ai taillé les griffes de mon animal et une a été coupée trop courte, elle saigne abondamment
- Mon animal semble avoir une dent cassée
- Mon animal a mangé un corps étranger



Soyez  
prudent !!

- Installation d'une muselière d'urgence



Mon  
animal  
s'est fait  
mordre /  
griffer



## Mon animal s'est fait mordre/griffer

- Pression pour stopper le saignement, s'il y a lieu. **JAMAIS DE GARROT** pour plus de 30 secondes.
- Les oreilles et la queue saignent toujours abondamment
- Nettoyer avec de l'eau, désinfecter avec de l'alcool diluée 50% ou du baxedin
- Vérifier le statut vaccinal du mordeur et du mordu
- Risque de formation d'un abcès chez le chat dans les jours suivant, à surveiller.
- Si attaque violente: consulter le vétérinaire, possibilité de dommages internes graves



# Intoxications



## Intoxications: règles de base

- Si le produit n'est pas abrasif ou irritant: essayer de faire vomir rapidement (peroxyde d'hydrogène ou apo-morphine)
- Le charbon activé peut se lier aux toxines pour limiter leur absorption
- Un soluté intraveineux est souvent requis (éliminer les toxines plus rapidement)
- Si possible, apporter l'emballage du produit lors de votre visite chez le vétérinaire.



# Mon animal a mangé du chocolat





## Mon animal a mangé du chocolat

- Substances toxiques = théobromine et caféine
- Chocolat noir = très toxique (6 onces de chocolat noir est toxique pour un chien de 10 kg)  
chocolat au lait et chocolat blanc = peu toxiques (50 onces de chocolat au lait ou 10 000 onces de chocolat blanc est toxique pour un chien de 10 kg)
- Effets : excitation, vomissements, diarrhée, fréquence cardiaque augmentée, arythmies cardiaques, halète, ataxie...



# Intoxications alimentaires

## Autres aliments toxiques pour pitou et minou



### Caféine

- Dose toxique = 80-150 mg/kg  
Un petit café = 80 mg
- Effets: excitation, vomissements, diarrhée, fréquence cardiaque augmentée, halète (6hrs après intoxication)



### Raisins

- Toxicité n'est pas dose-dépendante. 50% des animaux ne seront pas affectés
- Tous types de raisins
- Effets: vomissements, diarrhée, insuffisance rénale sévère



### Oignons et ail

- Dose toxique = >0,5% du poids de l'animal (50g pour un chien de 10 kg)
- Effets : anémie par destruction des globules rouges (2 semaines après intoxication)

## Quelques plantes toxiques



# Intoxications aux plantes



**Poinsettia**  
*(Euphorbia pulcherrima)*

- Sève toxique
- Toxicité pire chez les CHATS
- Effets : vomissements, diarrhée, hypersalivation (signes dus à l'irritation de la muqueuse digestive)
- Rincer la gueule



**Lys de Pâques**  
*(Lilium longiflorum)*  
*ainsi que tous types de lys*

- Toxicité pire chez les CHATS
- Effets : vomissements, anorexie, léthargie, tremblements, déshydratation, insuffisance rénale et même mort (en 1 à 3 jours si pas traité)

# Intoxications aux plantes

## Quelques plantes toxiques

### Laurier rose (*Nerium oleander*)




- Toutes les parties de la plante sont toxique
- Dose toxique (à titre indicatif)= 2-3 feuilles sont toxiques pour un chien de 10 kg.
- Temps d'apparition avant les symptômes: 2h à 3 jours
- Effets : nausées, vomissements, pertes d'équilibres, convulsions, tremblements, abattement, troubles cardiaques, coma et mort.
- Pronostic sombre sans traitement, récupération lente




### Marijuana et autres drogues

- Effets : sédation, ataxie, vomissements, hypotension, pupilles dilatées, fréquence cardiaque augmentée ou diminuée (selon type de drogue), hypothermie ou hyperthermie (selon type de drogue), coma et mort.
- Temps d'apparition avant les symptômes: 5 min à 12h

# Mon animal a ingéré du poison à rat



# Mon animal a ingéré du poison à rat



- Poison à rat contient un anticoagulant.
- Odeur appétente
- Faire vomir si ingéré depuis moins de 2h
- Effets: problème de coagulation, pétéchies, mort
- Symptômes apparaissent 48h à 7 jours après l'ingestion
- Consulter un vétérinaire dans les plus brefs délais.
- Traitement: vitamine K pour favoriser la coagulation, tranfusion sanguine dans certains cas
- Pronostic bon si traitements rapidement



# Intoxications

## Autres produits toxiques



**Antigel  
(Éthylène glycol)**

- Dose toxique = 1 c thé/ kg chien et ¼c thé/kg chat
- Goût sucré
- Effets : dépression du système nerveux central (est comme "en état d'ébriété"), dommages rénaux, convulsions, coma et mort
- Temps d'apparition avant les symptômes: 2-4hrs



**Anti-inflammatoires humains  
Advil® et Tylenol®**

- Dose toxique = 50 mg/kg
- Effets secondaires: troubles digestifs, ulcères gastriques, insuffisance rénale ou hépatique

# Intoxications

## Autres produits toxiques



### Perméthrinés (Zodiac, K9, ...)

- TOXIQUE CHEZ LE CHAT
- Effets : irritation de la peau (à l'endroit où la fiole a été appliquée), hypersalivation, nausées, vomissements, diarrhée, spasmes, ataxie, convulsions, coma et mort
- Temps d'apparition avant les symptômes: 30 min à quelques heures
- En clinique: shampoing kératolytique, Methocarbamol pour contrôler les convulsions, fluidothérapie intraveineuse, médication.



### Xylitol

- Type de sucre extrait de l'écorce de bouleau, utilisé comme substitut du sucre classique
- Dose toxique = 0,1 g/kg
- Retrouvé dans les gommes à mâcher, certains bonbons, certains sirops pour la toux
- Effets: hypoglycémie, insuffisance hépatique

# Intoxications

## Autres produits toxiques



### Nourriture avariée

- Désordres digestifs (diarrhée, vomissements)



### Produits pour entretien du spa

- Brûlures



### Herbicide

- Désordres digestifs (vomissements, diarrhée, parfois avec sang)



### Détergents, désodorisants et autres produits ménagers

- Désordres digestifs (vomissements, diarrhée)
- Irritation peau
- toux

# Mon animal fait une crise d'épilepsie



<https://www.youtube.com/watch?v=RE9By6Y3a2A>

CHAT




<https://www.youtube.com/watch?v=1e8k0txJjDw>

CHIEN

Mon animal  
fait une crise  
d'épilepsie

Qu'est-ce qu'une crise d'épilepsie?



Une décharge électrique  
incontrôlée, dans le cerveau

# Mon animal fait une crise d'épilepsie

## Quoi faire ?

- Éloigner tout objet/meuble qui pourrait le blesser
- Ne pas essayer de l'arrêter dans ses mouvements.
- Ne pas mettre notre main près de sa gueule.
- Peut uriner/déféquer.
- Crise souvent précédée d'un "aura"  
(comportement anormal précurseur de la crise).



# Mon animal fait une crise d'épilepsie


★ TOUJOURS noter sur un calendrier la date de la crise et sa durée.

- Consulter un vétérinaire dans les prochains jours.
- Si une crise dure plus de 5 minutes ou si l'animal fait plusieurs crises consécutives, se rendre chez le vétérinaire immédiatement.



# Mon animal fait une crise d'épilepsie

- Causes:
  - épilepsie idiopathique
  - maladie métabolique (hépatite, diabète...)
  - trauma crânien
  - intoxication
  - méningite
  - méningoencéphalite
  - tumeur au cerveau
- Tests: bilan sanguin complet et idéalement imagerie du cerveau (SCAN, IRM)



Mon  
animal  
s'est fait  
piqué par  
un insecte  
et enfle



## Mon animal s'est fait piqué par un insecte et enfle

- Il s'agit d'une réaction allergique!
- S'assurer que l'enflure n'entrave pas sa respiration. Si difficulté respiratoire = urgence!
- Ce type de réaction peut aussi se produire après un vaccin.
- Si bon état général et pas de trouble respiratoire = Benadryl®. Téléphoner en clinique vétérinaire pour connaître la dose adéquate à donner à votre animal. Peut être répété 2 à 3 fois par jour, au besoin.



Mon  
animal  
s'est fait  
arroser par  
une  
mouffette



# Mon animal s'est fait arrosé par une mouffette

- Shampooining Skunk Off® fonctionne bien quand on l'applique en 1er, quand l'animal vient tout juste d'être arrosé.
- Rincer les yeux à grande eau.
- Spray : l'odeur a tendance à ressortir lorsque l'animal a le pelage humide.
- Consulter seulement si douleur aux yeux (kératite)



Mon animal  
s'est fait  
arrosé par une  
mouffette

## Recette maison solution contre odeur de mouffette




### INGRÉDIENTS

- 4 tasses de peroxyde 3 %
- ¼ tasse de bicarbonate de soude
- 1 cu. à thé de savon liquide (savon à vaisselle)

### ÉTAPES

1. Utiliser une éponge pour imbiber le poil de la solution.
2. Rincer.
3. Répéter au besoin.

★ Peut faire pâlir le poil foncé.



+



+



=



J'ai coupé la  
griffe de mon  
animal trop  
courte et ça  
saigne



J'ai coupé la  
griffe de mon  
animal trop  
courte et ça  
saigne



Première étape:





Rester calme!

J'ai coupé la griffe de mon animal trop courte et ça saigne

- pression 3 minutes
- bicarbonate de soude
- corps farineux
- gratter la griffe sur une barre de savon
- Kwik stop (poudre) ou bâtons de nitrate d'argent



# Mon animal a avalé un corps étranger




Mon animal a  
avalé un corps  
étranger

## Symptômes

- vomissements
- Apathie
- Anorexie
- Douleur abdominale (peut avoir de la difficulté à trouver une position).



# Mon animal a avalé un corps étranger



# Mon animal a avalé un corps étranger

## En clinique...

- Examen vétérinaire: palpation abdominale
- Imagerie: radiographies et/ou échographie, baryum
- Induction des vomissements avec un comprimé d'apomorphine
- Bilan sanguin complet: biochimie et hématologie
- Chirurgie: laparotomie exploratrice

